

SUMMARY

Print Dimensions when closed: 4" x 9"
Print Dimensions for open spread: 8" x 9"

[illegible]



HIỆU RU RUI CỦA QUÝ VỊ



romosozumab (aqqp)
phần tử này có thể

Không điều trị chứng loãng xương sau mãn kinh sẽ làm tăng thêm nguy cơ gãy xương.

- Sau khi mãn kinh, lượng xương cơ thể quý vị mất đi sẽ nhiều hơn lượng xương tạo ra
- Loãng xương là căn bệnh tiến triển âm thầm, có nghĩa là bệnh sẽ trở nên trầm trọng hơn theo thời gian nếu không được điều trị. Dấu hiệu cảnh báo duy nhất có thể là gãy xương
- 2 trong số 3 phụ nữ bị loãng xương sau mãn kinh có nguy cơ gãy xương cao sẽ bị gãy một xương nào đó trong đời
- Sau khi bị gãy xương do loãng xương, nguy cơ quý vị bị gãy xương lần nữa trong vòng một năm tiếp theo cao gấp 5 lần

Biết rủi ro của quý vị

Quý vị càng có nhiều yếu tố nguy cơ sau đây thì nguy cơ gãy xương của quý vị càng cao.

- ☐ Diêm Tễ hơn hoặc bằng -2.5
- ☐ 65 tuổi trở lên
- ☐ Trọng lượng cơ thể thấp
- ☐ Đã từng gãy xương
- ☐ Sử dụng steroid lâu dài, chẳng hạn như prednisone
- ☐ Uống rượu bia ≥ 3 ly/ngày
- ☐ Chạm tay bị gãy xương hông
- ☐ Hút thuốc lá
- ☐ Viêm khớp dạng thấp
- ☐ Bệnh tiểu đường



Thông tin Quan trọng về An toàn (tiếp)

Chống dùng EVENTY® nếu quý vị bị hạ canxi máu; hoặc bị ỉn ợng từ romosozumab hoặc bất kỳ thành phần nào trong EVENTY.

Vui lòng xem thêm Thông tin Quan trọng về An toàn ở trang 34-35.

Quý vị lo lắng mình có thể gặp rủi ro?

Đừng chờ đến khi gãy xương. Hãy hành động ngay và trao đổi với bác sĩ về việc tái tạo xương mới bằng EVENTY.

2

3

BIẾT ĐIỂM CỦA QUÝ VỊ, biết quý vị có nhiều lựa chọn

Đã đến lúc cần chọn DXA hoặc?

Chọn DXA là một thủ thuật nhanh chóng, không đau, không xâm lấn giúp đo mật độ xương và cung cấp điểm T để đánh giá mức độ loãng xương của quý vị và liệu quý vị có nguy cơ gãy xương hay không.

Nếu quý vị đã được chẩn đoán mắc bệnh loãng xương sau mãn kinh, bác sĩ có thể nghĩ đến làm thủ thuật DXA ngay 1 đến 2 năm một lần để theo dõi tiến trình điều trị của quý vị.

Điểm T của quý vị giúp xác định mức độ nghiêm trọng của nguy cơ gãy xương của quý vị



EQUITY® nhanh chóng hiện thành xương mới chỉ trong 12 tháng



XƯƠNG BỀN LỎNG XƯƠNG


CHƯA ĐIỀU TRỊ

Mỗi xương chịu được tải vào khoảng 2.5 từ một phụ nữ trẻ loãng xương sau mãn kinh đang dùng giả dược.



ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG EQUITY

Mỗi xương cần được tải vào khoảng từ 12 từ một phụ nữ trẻ loãng xương sau mãn kinh đang được điều trị bằng EQUITY®.



Mật độ xương bình thường

Mật độ xương thấp

Loãng xương


Điểm T mật độ xương từ -2.5 trở xuống được xem là loãng xương. **Điểm càng thấp thì nguy cơ gãy xương càng cao.**

Chỉ nhận một dịch minh họa. Mỗi xương được lấy từ 2 phụ nữ khác nhau trong một nghiên cứu mở đầu 180 phụ nữ trẻ loãng xương sau mãn kinh. Hình ảnh được chọn là từ những phụ nữ gần mức trung bình trong mẫu nghiên cứu.

Thông tin Quan trọng về An toàn (tiếp)

EQUITY® có thể gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng. Các tác dụng phụ nghiêm trọng có thể xảy ra bao gồm phản ứng dị ứng nghiêm trọng, sưng cảm lạnh hoặc mũi chảy, các vấn đề nghiêm trọng về xương hàm và gãy xương cổ bất thường.

Vui lòng xem thêm Thông tin Quan trọng về An toàn ở trang 14-15.



Quý vị đã sẵn sàng làm chậm quá trình làm chậm quá trình mất xương chưa?

Hãy hỏi bác sĩ xem bạn có đủ điều kiện để bắt đầu tải thuốc xương mới hay không.

Tại sao lại là EVENITY®

EVENITY là phương pháp điều trị loãng xương đầu tiên và duy nhất có tác dụng theo hai cách

Các phương pháp điều trị loãng xương bằng thuốc chỉ đơn thuần chỉ có tác dụng tạm thời mà không giải quyết được gốc rễ của bệnh, trong khi thuốc đồng hormone giúp kích thích hình thành xương.

EVENITY là chất tạo xương duy nhất có thể giúp làm chậm quá trình mất xương, ở mức độ thấp hơn.



Bắt đầu bằng EVENITY

1=2

LƯỢC TIÊM

Mỗi liều EVENITY bao gồm 2 mũi tiêm



ĐƯỢC TIÊM HẰNG THÁNG

EVENITY được cung cấp đều đặn hàng tháng trong chuyên viên khám tại phòng khám của quý vị

12

THÁNG

EVENITY chỉ được dùng trong 12 tháng

Mỗi liều EVENITY bao gồm 2 mũi tiêm được thực hiện một lần mỗi năm sau đó. Sau thời kỳ này 2 mũi tiêm được thay thế bằng 1 mũi tiêm duy nhất. Quý vị cần phải uống canxi và vitamin D theo chỉ định của bác sĩ. Trong quá trình dùng thuốc EVENITY, quý vị sẽ bị mất một chút lượng xương. Nhưng với bất cứ ai của quý vị đang sinh sống thì để lớn lên lại.

Thông tin Quan trọng về An toàn (tiếp)

Tác dụng phụ phổ biến nhất của EVENITY là đau khớp và nhức đầu.

Vui lòng xem thêm Thông tin Quan trọng về An toàn ở trang 14-15.

Quý vị đã sẵn sàng làm nhiều hơn việc chỉ làm chậm quá trình mất xương chưa?


Hãy hỏi bác sĩ xem bài gây cơ phải là lúc để bắt đầu tại tạo xương mới hay không.



EVERINITY
(romosomax-200mg)
sodium bisphosphonate

Kết quả tại 12 THÁNG

EVERINITY làm tăng đáng kể mật độ khoáng xương ở cột sống thắt lưng, toàn bộ hông và cổ xương đùi sau 12 tháng so với giả dược*



*Kết quả BMD không đo ở giảm nguy cơ gãy xương.

Trong một nghiên cứu theo dõi hơn 7.000 phụ nữ bị loãng xương sau mãn kinh được dùng EVERINITY hoặc giả dược (một phương pháp điều trị không dùng thuốc) trong 12 tháng, những phụ nữ dùng EVERINITY có mật độ khoáng xương (BMD) ở cột sống thắt lưng, toàn bộ hông và cổ xương đùi tăng đáng kể so với những phụ nữ dùng giả dược.

Đã đến lúc bắt đầu tái tạo xương mới với EVERINITY chưa?

Hãy hỏi bác sĩ xem EVERINITY có phù hợp với quý vị không.



Thông tin quan trọng về An toàn (tiếp)

Quý vị nên bổ sung canxi và vitamin D theo chỉ định của bác sĩ trong thời gian dùng thuốc EVERINITY.

Vui lòng xem thêm Thông tin Quan trọng về An toàn ở trang 14-15.

EVERINITY làm giảm đáng kể nguy cơ gãy xương cột sống khi trị trong 12 tháng

Trong một nghiên cứu lâm sàng được trình bày trong bài viết này, những phụ nữ dùng EVERINITY ít bị gãy xương cột sống hơn những phụ nữ dùng giả dược sau 12 tháng. Tỷ lệ gãy xương ngoài cột sống không đáng kể sau 12 tháng.

Sau 12 tháng sử dụng EVERINITY, hãy hỏi bác sĩ của quý vị về

- Lần lịch chụp DXA để xem kết quả điều trị của quý vị sau EVERINITY
- Một phương pháp điều trị tiếp theo để duy trì xương mới hình thành

8

9

AN TOÀN
EVENTY®

EVENITY
(ronostomab-áp-pap)
sản phẩm cấp 12.16

EVENITY đã được nghiên cứu trên gần 12.000 phụ nữ

Bất cứ khi nào quý vị bắt đầu dùng một loại thuốc mới, quý vị nên hiểu rõ những tác dụng phụ có thể xảy ra. Trong trường hợp loãng xương, điều quan trọng là phải hiểu rằng không điều trị có thể dẫn đến nguy cơ gãy xương cao hơn. Nói chuyện với bác sĩ của quý vị và cùng nhau quý vị có thể đưa ra quyết định sáng suốt.

Một nghiên cứu của EVENITY trên 7.000 phụ nữ

An toàn thuốc là điều quan trọng. EVENITY đã được nghiên cứu để tìm hiểu về những lợi ích và tác dụng phụ có thể xảy ra khi sử dụng thuốc này.

Một nghiên cứu của EVENITY đã đánh giá hơn 7.000 phụ nữ bị loãng xương sau mãn kinh được dùng EVENITY hoặc giả được. Tác dụng phụ thường gặp nhất là đau khớp và nhức đầu. Đây không phải là tất cả các tác dụng phụ có thể xảy ra của EVENITY. Hãy trao đổi với bác sĩ để tìm hiểu thêm về các tác dụng phụ nghiêm trọng tiềm ẩn của EVENITY. Xem phần so sánh các tác dụng phụ phổ biến nhất từ nghiên cứu được báo cáo dưới đây.

Giai được: 3.576 phụ nữ sử dụng
EVENITY: 3.583 phụ nữ sử dụng

Đau khớp 12.1%
13.1%

Nhức đầu 5.9%
6.6%

Vui lòng xem thêm Thông tin Quan trọng về An toàn ở trang 14-15.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập
evenity.com Vui lòng

10

11

Thanh toán cho EVENITY®

EVENITY được bảo hiểm bởi nhiều chương trình Medicare và thương mại

Chỉ phụ vụ cho các tỉnh thành nhận sẽ khác nhau.

MEDICARE

- ▶ Hầu hết bệnh nhân Medicare Phần B đều có bảo hiểm về sung và có thể từ đó để lựa chọn mua EVENITY®
- ▶ Sau khi quý vị đến khám một khu tư của mình, Medicare Phần B thường chi trả 80% các liệu pháp quý vị nhận được tại văn phòng bác sĩ của mình
- ▶ Quý vị có thể mua thêm bảo hiểm từ Đại Chương trình bổ sung Medicare hoặc Medigap, thương mại, TRICARE để được hưởng thêm 20%

- Quý vị có thể phải trả thêm phí bảo hiểm hàng tháng nhỏ hơn các báo hiểm bổ sung này
- Chỉ phụ vụ chi trả không bao gồm chi phí liên quan đến việc khám tại phòng khám hoặc tiêm EVENITY

Số tiền quý vị phải trả cho EVENITY sẽ tùy thuộc vào tổng số tiền mà quý vị tự thanh giá. Hãy truy cập vào cổng tự báo hiểm của quý vị để tìm hiểu số tiền quý vị sẽ phải trả cho EVENITY

*Dữ liệu về mức báo hiểm Amgen SupportPlus từ ngày 01/01/2023 đến tháng 12/01/2023 đã được phân tích để xác định Phí bắt COP. EVENITY chỉ trả bệnh nhân riêng lẻ vào phần tin.

- *Số tiền quý vị phải trả có thể thay đổi trước và sau khi bạn hoàn tất sung.
- *Quý vị phải đăng ký Medicare Phần A và Phần B để nhận được quyền tham gia Bảo hiểm bổ sung Medicare. Bảo hiểm bổ sung Medicare có thể yêu cầu phí bảo hiểm nhỏ hơn sung hàng tháng

BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI

- ▶ Chương trình đồng thanh toán Amgen® SupportPlus có thể giúp bệnh nhân có bảo hiểm tự nhiên hoặc thương mại giảm chi phí tự trả của họ
- ▶ Bệnh nhân đủ điều kiện được bảo hiểm thương mại có thể chi trả 25 đô la cho mỗi liều với Chương trình đồng thanh toán Amgen SupportPlus
- ▶ Có thể áp dụng cho khoản khấu trừ, đồng bảo hiểm và đồng thanh toán
- ▶ Tiêu chí để được miễn thuế mới tối đa của chương trình đồng cấp điện. Xem www.amgensupportplus.com/copy để biết đầy đủ Điều khoản và Điều kiện



KHÔNG ĐƯỢC BẢO HIỂM


- ▶ Đại diện Amgen SupportPlus có thể cung cấp thông tin về các cách thực hiện tự nguyện đóng lệ phí cho người 65 tuổi lớn hơn là Amgen SupportPlus để biết thêm thông tin theo số 1-866-564-2778

Việc duy trì bảo hiểm của người lớn có thể changing thời gian tự nguyện nhận phí tự nguyện đóng lệ phí có thể xảy ra dựa trên loại của chi phí chi trả phần bù. Amgen không kiểm soát các changing thời gian này và chỉ Công cụ chúng ta như một phần mềm tính toán.



Nếu quý vị không chắc chắn mình có chương trình Medicare nào hay đang tìm kiếm thông tin, hãy nói chuyện với nhà cung cấp bảo hiểm của quý vị và truy cập eventy.com/paying để biết thêm chi tiết.

Vui lòng xem thêm Thông tin Quan trọng về An toàn ở trang L4-L5.



Thông tin Quan trọng về An toàn

Thông tin quan trọng nhất từ nền biết về ENVYNT là gì?

ENVYNT có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng, bao gồm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ hoặc tử vong do vấn đề tim mạch (tim hoặc mạch máu). Gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị hoặc nhân viên giúp khẩn cấp ngay lập tức nếu quý vị hoặc kỹ thuật viên của quý vị trải qua chứng đau tim, có các triệu chứng đau ngực hoặc cảm thấy chóng mặt hoặc chóng mặt, hoặc các triệu chứng khác như: có thể bao gồm ngứa, đau hoặc yếu ở mắt, cảm thấy hoặc cảm thấy không cân bằng, hoặc các triệu chứng khác. Trước khi dùng ENVYNT, hãy cho bác sĩ biết nếu quý vị đã từng bị đau tim hoặc đột quỵ, hoặc bất kỳ tình trạng này xảy ra trong quá khứ.

Không dùng ENVYNT nếu quý vị bị dị ứng với monepantel hoặc bất kỳ thành phần nào của ENVYNT.

Trước khi dùng ENVYNT, hãy cho bác sĩ biết về mọi tình trạng bệnh lý của quý vị, bao gồm cả trường hợp quý vị:

- có tiền sử các vấn đề về tim hoặc mạch máu khác
- đang dùng thuốc trong máu thấp
- không thể uống canxi và vitamin D hàng ngày
- có vấn đề về thận hoặc đang thay thận
- sử dụng phụ thuộc vào khoa hoặc nội bộ

Tác dụng phụ có thể xảy ra của các tác dụng phụ nghiêm trọng, bao gồm:

ENVYNT có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng, bao gồm:

- **Phản ứng dị ứng nghiêm trọng** do xảy ra ở những người dùng ENVYNT. Gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị hoặc đến phòng cấp cứu gần nhất ngay nếu quý vị có bất kỳ triệu chứng nào của phản ứng dị ứng nghiêm trọng bao gồm: phát ban, nổi da đỏ, sưng mắt, mũi, miệng, lưỡi hoặc cổ họng có thể gây khó khăn hoặc tắc.

Nồng độ canxi trong máu thấp (hạ canxi máu). ENVYNT có thể làm giảm nồng độ canxi trong máu của quý vị. Tình trạng canxi trong máu thấp của quý vị cần được điều trị trước khi dùng ENVYNT. Gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu quý vị có các triệu chứng của lượng canxi trong máu thấp như: co thắt, co giật hoặc chuột rút ở cơ, hoặc ngứa ran ở ngón tay, ngón chân hoặc quanh miệng.

Các vấn đề nghiêm trọng về xương hàm (loãng xương) có thể xảy ra. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần kiểm tra miệng của quý vị trước khi bắt đầu dùng ENVYNT và có thể yêu cầu quý vị đến gặp bác sĩ. Hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc nhà sĩ của quý vị về cách chăm sóc răng miệng tốt.

Gây sưng đau bất thường. Các triệu chứng của loại gây sưng này bao gồm cơn đau môi hoặc bất thường ở họng, hoặc hóc thức.

Tác dụng phụ phổ biến nhất của ENVYNT bao gồm đau khớp và nhức đầu.

Dây thừng phôi là tất cả các tác dụng phụ có thể xảy ra của ENVYNT. Gọi cho bác sĩ để được tư vấn về việc sử dụng phụ. Quý vị được khuyến khích báo cáo FDA các tác dụng phụ tiêu cực về tác dụng theo báo. Truy cập www.fda.gov/medwatch hoặc 1-800-FDA-1088.

Vui lòng xem Thông tin khi đơn vị của ENVYNT đi kèm, bao gồm Hướng dẫn khi sử dụng, trung tin.



14



15



EVERENITY[®]
 (romososumab-aqqg)
Injection 105 mg/157 mL

Một số cách giúp quý vị bắt đầu thảo luận với bác sĩ:

- Điều gì có thể xảy ra nếu tôi không điều trị bằng loãng xương sau mãn kinh?
- Chất tạo xương như EVERENITY[®] có thể giúp giảm nguy cơ gãy xương của tôi như thế nào?
- EVERENITY[®] so với các phương pháp điều trị loãng xương sau mãn kinh khác thì thế nào?

Quý vị cũng có thể quét mã QR nhằm truy cập everenity.com





Bone Matters

Nhận hỗ trợ với chương trình Bone Matters[®].

Bệnh nhân EVERENITY[®] có thể đăng ký để nhận lợi ích tiềm năng phi lợi nhuận thông tin dinh dưỡng và mẹo để duy trì cuộc sống năng động tại bonematters.com

Vui lòng xem Thông tin Quan trọng về An toàn ở trang 14-15.

© 2024 Amgen Inc. Bảo lưu mọi quyền. USA-785-82515 12/24

Đối với phụ nữ bị loãng xương sau
mãn kinh có nguy cơ gãy xương cao
Xin vui lòng

 **EVENITY**[®]
(romosozumab-aqqg)
injection 105 mg/1.17 mL

TÁI TẠO XƯƠNG MỚI NHANH CHÓNG

chỉ trong 12 tháng

Quý vị đã sẵn sàng bắt đầu
hành trình đạt được mục tiêu
xương chắc khỏe hơn chưa?

Được chấp thuận sử dụng

EVENITY[®] là thuốc kê đơn dùng để điều trị loãng xương ở phụ nữ sau mãn kinh có nguy cơ gãy xương cao hoặc không thể sử dụng thuốc trị loãng xương khác hoặc các loại thuốc trị loãng xương khác không có tác dụng tốt.

Thông tin Quan trọng về An toàn

Thông tin quan trọng nhất tôi nên biết về EVENITY là gì?

EVENITY có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng, bao gồm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ hoặc tử vong do vấn đề tim mạch (tim hoặc mạch máu). Gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị hoặc nhận trợ giúp khẩn cấp ngay lập tức nếu quý vị có bất kỳ triệu chứng nào sau đây: triệu chứng đau tim, có thể bao gồm: đau ngực hoặc tức ngực; hụt hơi; cảm thấy choáng váng hoặc chóng mặt; hoặc các triệu chứng của đột quỵ, có thể bao gồm: nhức đầu; tê hoặc yếu ở mặt, cánh tay hoặc chân; khó nói chuyện; thay đổi thị lực hoặc mất thăng bằng. Trước khi dùng EVENITY, hãy cho bác sĩ biết nếu quý vị đã từng bị đau tim hoặc đột quỵ, đặc biệt là nếu tình trạng này xảy ra trong năm qua.

Vui lòng xem thêm Thông tin Quan trọng về An toàn ở trang 14-15.

Hiệu RỦI RO CỦA QUÝ VỊ

Open Spread: 8" x 9"

EVENITY®
(romosozumab-aqqg)
injection 105 mg/1.17 mL

Không điều trị chứng loãng xương sau mãn kinh sẽ làm tăng thêm nguy cơ gãy xương.

- ▶ Sau khi mãn kinh, lượng xương cơ thể quý vị mất đi sẽ nhiều hơn lượng xương tạo ra
- ▶ Loãng xương là căn bệnh tiến triển âm thầm, có nghĩa là bệnh sẽ trở nên trầm trọng hơn theo thời gian nếu không được điều trị. Dấu hiệu cảnh báo duy nhất có thể là gãy xương
- ▶ 2 trong số 3 phụ nữ bị loãng xương sau mãn kinh có nguy cơ gãy xương cao sẽ bị gãy một xương nào đó trong đời
- ▶ Sau khi bị gãy xương do loãng xương, nguy cơ quý vị bị gãy xương lần nữa trong vòng một năm tăng cao gấp 5 lần

Biết rủi ro của quý vị

Quý vị càng có nhiều yếu tố nguy cơ sau đây thì nguy cơ gãy xương của quý vị càng cao.

- ☐ Điểm T nhỏ hơn hoặc bằng -2.5
- ☐ 65 tuổi trở lên
- ☐ Trọng lượng cơ thể thấp
- ☐ Đã từng gãy xương
- ☐ Sử dụng steroid lâu dài, chẳng hạn như prednisone
- ☐ Uống rượu bia ≥ 3 ly/ngày
- ☐ Cha mẹ bị gãy xương hông
- ☐ Hút thuốc lá
- ☐ Viêm khớp dạng thấp
- ☐ Bệnh tiểu đường



Thông tin Quan trọng về An toàn (tiếp)


Không dùng EVENITY® nếu quý vị: bị hạ canxi máu; hoặc bị dị ứng với romosozumab hoặc bất kỳ thành phần nào trong EVENITY.

Vui lòng xem thêm Thông tin Quan trọng về An toàn ở trang 14-15.

Quý vị lo lắng mình có thể gặp rủi ro?

Đừng chờ đến khi gãy xương. Hãy hành động ngay và trao đổi với bác sĩ về việc tái tạo xương mới bằng EVENITY.

BIẾT ĐIỂM CỦA QUÝ VỊ, biết quý vị có nhiều lựa chọn




Đã đến lúc cần chụp DXA chưa?

Chụp DXA là một thủ thuật nhanh chóng, không đau, không xâm lấn giúp đo mật độ xương và cung cấp điểm T để đánh giá mức độ loãng xương của quý vị và liệu quý vị có nguy cơ gãy xương hay không.

Nếu quý vị đã được chẩn đoán mắc bệnh loãng xương sau mãn kinh, bác sĩ có thể đề nghị kiểm tra mật độ xương 1 đến 2 năm một lần để theo dõi tiến trình điều trị của quý vị.

Điểm T của quý vị giúp xác định mức độ nghiêm trọng của nguy cơ gãy xương của quý vị



Thông tin Quan trọng về An toàn (tiếp)

EVENITY® có thể gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng. Các tác dụng phụ nghiêm trọng có thể xảy ra bao gồm phản ứng dị ứng nghiêm trọng, lượng canxi trong máu thấp, các vấn đề nghiêm trọng về xương hàm và gãy xương đùi bất thường.

Vui lòng xem thêm Thông tin Quan trọng về An toàn ở trang 14-15.


EVENITY nhanh chóng hình thành xương mới chỉ trong 12 tháng

XƯƠNG BỊ LOÃNG XƯƠNG



CHƯA ĐIỀU TRỊ

Mẫu xương chậu được lấy vào tháng thứ 12 từ một phụ nữ bị loãng xương sau mãn kinh đang dùng giả dược.



ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG EVENITY

Mẫu xương chậu được lấy vào tháng thứ 12 từ một phụ nữ bị loãng xương sau mãn kinh đang điều trị bằng EVENITY.

Chỉ nhằm mục đích minh họa. Mẫu xương được lấy từ 2 phụ nữ khác nhau trong một nghiên cứu nhỏ gồm 139 phụ nữ bị loãng xương sau mãn kinh. Hình ảnh được chọn là từ những phụ nữ gần mức trung bình trong mỗi nhóm.

Quý vị đã sẵn sàng làm nhiều hơn là chỉ làm chậm quá trình mất xương chưa?

Hãy hỏi bác sĩ xem bây giờ có phải là lúc để bắt đầu tái tạo xương mới hay không.



EVENTITY là phương pháp điều trị loãng xương đầu tiên và duy nhất có tác dụng theo hai cách

Các phương pháp điều trị loãng xương bằng thuốc kê đơn thường chỉ có tác dụng theo một trong hai cách: thuốc chống hủy xương làm chậm quá trình mất xương, trong khi thuốc đồng hóa giúp kích thích hình thành xương.

EVENTITY là chất tạo xương duy nhất có thể giúp làm chậm quá trình mất xương, ở mức độ thấp hơn.

**HÌNH THÀNH
XƯƠNG MỚI**

**LÀM CHẬM QUÁ
TRÌNH MẤT XƯƠNG**

Bắt đầu bằng EVENTITY

1=2

LIỀU TIÊM
LƯỢNG

Mỗi liều EVENTITY bao
gồm 2 mũi tiêm



**ĐƯỢC TIÊM HÀNG
THÁNG**

EVENTITY được cung cấp hàng
tháng trong chuyến thăm khám
tại phòng khám của quý vị

12

THÁNG

EVENTITY chỉ được dùng
trong 12 tháng

Mỗi liều EVENTITY bao gồm 2 mũi tiêm dưới da được bác sĩ hoặc nhân viên chăm sóc sức khỏe tiêm cho quý vị mỗi tháng. Quý vị nên bổ sung canxi và vitamin D theo chỉ định của bác sĩ trong thời gian dùng thuốc EVENTITY. Nếu quý vị bỏ lỡ một cuộc hẹn, hãy liên hệ với bác sĩ của quý vị càng sớm càng tốt để lên lịch lại.

Thông tin Quan trọng về An toàn (tiếp)

Tác dụng phụ phổ biến nhất của EVENTITY là đau khớp và nhức đầu.


Vui lòng xem thêm Thông tin Quan trọng về An toàn ở trang 14-15.

Quý vị đã sẵn sàng làm nhiều hơn việc chỉ làm chậm quá trình mất xương chưa?

Hãy hỏi bác sĩ xem bây giờ có phải là lúc để bắt đầu tái tạo xương mới hay không.

Kết quả tại 12 THÁNG

EVENITY làm tăng đáng kể mật độ khoáng xương ở cột sống thắt lưng, toàn bộ hông và cổ xương đùi sau 12 tháng so với giả dược*



*Kết quả BMD không ngụ ý giảm nguy cơ gãy xương.

Trong một nghiên cứu theo dõi hơn 7.000 phụ nữ bị loãng xương sau mãn kinh được dùng EVENITY hoặc giả dược (một phương pháp điều trị không dùng thuốc) trong 12 tháng, những phụ nữ dùng EVENITY có mật độ khoáng xương (BMD) ở cột sống thắt lưng, toàn bộ hông và cổ xương đùi tăng đáng kể so với những phụ nữ dùng giả dược.

Thông tin Quan trọng về An toàn (tiếp)

Quý vị nên bổ sung canxi và vitamin D theo chỉ định của bác sĩ trong thời gian dùng thuốc EVENITY.

Vui lòng xem thêm Thông tin Quan trọng về An toàn ở trang 14-15.

EVENITY làm giảm đáng kể nguy cơ gãy xương cột sống chỉ trong 12 tháng

Trong cùng một nghiên cứu lâm sàng được trình bày trong bài viết này, những phụ nữ dùng EVENITY ít bị gãy xương cột sống mới hơn những phụ nữ dùng giả dược sau 12 tháng. Tỷ lệ gãy xương ngoài cột sống giảm không đáng kể sau 12 tháng.

Sau 12 tháng sử dụng EVENITY, hãy hỏi bác sĩ của quý vị về

- Lên lịch chụp DXA để xem kết quả điều trị của quý vị sau EVENITY
- Một phương pháp điều trị tiếp theo để duy trì xương mới hình thành

Đã đến lúc bắt đầu tái tạo xương mới với EVENITY chưa?

Hãy hỏi bác sĩ xem EVENITY có phù hợp với quý vị không.



EVENTITY đã được nghiên cứu trên gần 12.000 phụ nữ


Bất cứ khi nào quý vị bắt đầu dùng một loại thuốc mới, quý vị nên hiểu rõ những tác dụng phụ có thể xảy ra. **Trong trường hợp loãng xương, điều quan trọng là phải hiểu rằng không điều trị có thể dẫn đến nguy cơ gãy xương cao hơn.** Nói chuyện với bác sĩ của quý vị và cùng nhau quý vị có thể đưa ra quyết định sáng suốt.



Một nghiên cứu của EVENTITY trên 7.000 phụ nữ

An toàn thuốc là điều quan trọng. EVENTITY đã được nghiên cứu để tìm hiểu về những lợi ích và tác dụng phụ có thể xảy ra khi sử dụng thuốc này.

Một nghiên cứu của EVENTITY đã đánh giá hơn 7.000 phụ nữ bị loãng xương sau mãn kinh được dùng EVENTITY hoặc giả dược. Tác dụng phụ thường gặp nhất là đau khớp và nhức đầu. Đây không phải là tất cả các tác dụng phụ có thể xảy ra của EVENTITY. Hãy trao đổi với bác sĩ để tìm hiểu thêm về các tác dụng phụ nghiêm trọng tiềm ẩn của EVENTITY. Xem phần so sánh các tác dụng phụ phổ biến nhất từ nghiên cứu được báo cáo dưới đây.



Vui lòng xem thêm Thông tin Quan trọng về An toàn ở trang 14-15.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập [eventity.com](https://www.eventity.com) Vui lòng

EVENITY được bảo hiểm bởi nhiều chương trình Medicare và thương mại

Chi phí tự chi trả của từng bệnh nhân sẽ khác nhau.

MEDICARE

- Hầu hết bệnh nhân Medicare Phần B đều có bảo hiểm bổ sung và có thể trả 0 đô la cho mỗi liều EVENITY*†
- Sau khi quý vị đạt đến hạn mức khấu trừ của mình, Medicare Phần B thường chi trả 80% các liệu pháp quý vị nhận được tại văn phòng bác sĩ của mình
- Quý vị có thể mua thêm bảo hiểm (ví dụ: Chương trình bổ sung Medicare hoặc Medigap, thương mại, TRICARE) để được hưởng thêm 20%‡
- Quý vị có thể phải trả thêm phí bảo hiểm hàng tháng với các bảo hiểm bổ sung này
- Chi phí tự chi trả không bao gồm chi phí liên quan đến việc khám tại phòng khám hoặc tiêm EVENITY
- Số tiền quý vị phải trả cho EVENITY sẽ tùy thuộc vào loại chương trình Medicare mà quý vị tham gia. Hãy trao đổi với công ty bảo hiểm của quý vị để tìm hiểu số tiền quý vị sẽ phải trả cho EVENITY

*Dữ liệu xác minh bảo hiểm Amgen SupportPlus từ tháng 01 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023 đã được phân tích để xác định Phân phối OOP. EVENITY chỉ đưa bệnh nhân tiềm năng vào phân tích.

†Số tiền quý vị phải trả có thể tùy thuộc vào phạm vi bảo hiểm bổ sung.

‡Quý vị phải đăng ký Medicare Phần A và Phần B để nhận được bảo hiểm thông qua Bảo hiểm Bổ sung Medicare (Medigap). Bảo hiểm Bổ sung Medicare có thể yêu cầu phí bảo hiểm bổ sung hàng tháng.

BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI

- Chương trình đồng thanh toán Amgen® SupportPlus có thể giúp bệnh nhân có bảo hiểm tư nhân hoặc thương mại giảm chi phí tự trả của họ Nếu
- Bệnh nhân đủ điều kiện được bảo hiểm thương mại có thể chỉ phải trả 25 đô la cho mỗi liều với Chương trình đồng thanh toán Amgen SupportPlus
- Có thể áp dụng cho khoản khấu trừ, đồng bảo hiểm và đồng thanh toán
- Tiêu chí đủ điều kiện và mức tối đa của chương trình được áp dụng. Xem www.amgensupportplus.com/copay để biết đầy đủ Điều khoản và Điều kiện



KHÔNG ĐƯỢC BẢO HIỂM

- Đại diện Amgen SupportPlus có thể cung cấp thông tin về các tổ chức phi lợi nhuận độc lập có thể giúp đỡ. Vui lòng liên hệ với Amgen SupportPlus để biết thêm thông tin theo số 1-866-264-2778

*Việc đủ điều kiện nhận các nguồn lực do các chương trình hỗ trợ bệnh nhân phi lợi nhuận độc lập cung cấp là tùy thuộc vào tiêu chí của tổ chức phi lợi nhuận đó. Amgen không kiểm soát các chương trình này và chỉ cung cấp thông tin như một phép lịch sự.



Nếu quý vị không chắc chắn mình có chương trình Medicare nào hoặc đang tìm kiếm thêm thông tin, hãy nói chuyện với nhà cung cấp bảo hiểm của quý vị và truy cập evenity.com/paying để biết thêm chi tiết.

Vui lòng xem thêm Thông tin Quan trọng về An toàn ở trang 14-15.

Thông tin Quan trọng về An toàn

Thông tin quan trọng nhất tôi nên biết về EVENITY® là gì?

EVENITY có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng, bao gồm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ hoặc tử vong do vấn đề tim mạch (tim hoặc mạch máu). Gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị hoặc nhận trợ giúp khẩn cấp ngay lập tức nếu quý vị có bất kỳ triệu chứng nào sau đây: triệu chứng **đau tim**, có thể bao gồm: đau ngực hoặc tức ngực; hụt hơi; cảm thấy choáng váng hoặc chóng mặt; hoặc các triệu chứng của **đột quỵ**, có thể bao gồm: nhức đầu; tê hoặc yếu ở mặt, cánh tay hoặc chân; khó nói chuyện; thay đổi thị lực hoặc mất thăng bằng. Trước khi dùng EVENITY, hãy cho bác sĩ biết nếu quý vị đã từng bị đau tim hoặc đột quỵ, đặc biệt là nếu tình trạng này xảy ra trong năm qua.

Không dùng EVENITY nếu quý vị: bị hạ canxi máu; hoặc bị dị ứng với romosozumab hoặc bất kỳ thành phần nào trong EVENITY.

Trước khi dùng EVENITY, hãy cho bác sĩ biết về mọi tình trạng bệnh lý của quý vị, bao gồm cả trường hợp quý vị:

- có tiền sử các vấn đề về tim hoặc mạch máu khác
- có lượng canxi trong máu thấp
- không thể uống canxi và vitamin D hàng ngày
- có vấn đề về thận hoặc đang chạy thận
- dự định phẫu thuật nha khoa hoặc nhổ bỏ răng

Tác dụng phụ có thể xảy ra của EVENITY là gì?

EVENITY có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng, bao gồm:

Phản ứng dị ứng nghiêm trọng đã xảy ra ở những người dùng EVENITY. Gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị hoặc đến phòng cấp cứu gần nhất ngay nếu quý vị có bất kỳ triệu chứng nào của phản ứng dị ứng nghiêm trọng bao gồm: phát ban; nổi mề đay; sưng mặt, môi, miệng, lưỡi hoặc cổ họng có thể gây khó nuốt hoặc thở.

Nồng độ canxi trong máu thấp (hạ canxi máu). EVENITY có thể làm giảm nồng độ canxi trong máu của quý vị. Tình trạng canxi trong máu thấp của quý vị cần được điều trị trước khi dùng EVENITY. Gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu quý vị có các triệu chứng của lượng canxi trong máu thấp như: co thắt, co giật hoặc chuột rút ở cơ; tê hoặc ngứa ran ở ngón tay, ngón chân hoặc quanh miệng.

Các vấn đề nghiêm trọng về xương hàm (hoại tử xương) có thể xảy ra. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ kiểm tra miệng của quý vị trước khi quý vị bắt đầu sử dụng EVENITY và có thể yêu cầu quý vị đến gặp nha sĩ. Hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc nha sĩ của quý vị về cách chăm sóc răng miệng tốt.

Gãy xương đùi bất thường. Các triệu chứng của loại gãy xương này bao gồm cơn đau mới hoặc bất thường ở hông, háng hoặc đùi.

Tác dụng phụ phổ biến nhất của EVENITY bao gồm đau khớp và nhức đầu.

Đây không phải là tất cả các tác dụng phụ có thể xảy ra của EVENITY. Gọi cho bác sĩ để được tư vấn y tế về tác dụng phụ.

Quý vị được khuyến khích báo cáo cho FDA các tác dụng phụ tiêu cực của thuốc theo toa. Truy cập www.fda.gov/medwatch hoặc gọi 1-800-FDA-1088.

Vui lòng xem Thông tin kê đơn đầy đủ của EVENITY đi kèm, bao gồm Hướng dẫn dùng thuốc, trong túi.

Một số cách giúp quý vị bắt đầu thảo luận với bác sĩ:

- Điều gì có thể xảy ra nếu tôi không điều trị chứng loãng xương sau mãn kinh?
- Chất tạo xương như EVENITY[®] có thể giúp giảm nguy cơ gãy xương của tôi như thế nào?
- EVENITY so với các phương pháp điều trị loãng xương sau mãn kinh khác như thế nào?

Quý vị cũng có thể quét mã QR này hoặc truy cập evenity.com



**Bone
Matters[®]**

Nhận hỗ trợ với chương trình Bone Matters[®].

Bệnh nhân EVENITY có thể đăng ký để nhận lời nhắc tiêm miễn phí, thông tin dinh dưỡng và mẹo để duy trì cuộc sống năng động tại bonematters.com

Vui lòng xem Thông tin Quan trọng về An toàn ở trang 14-15.

Đối với phụ nữ bị loãng xương sau mãn kinh có nguy cơ gãy xương cao Xin vui lòng



TÁI TẠO XƯƠNG MỚI NHANH CHÓNG

chỉ trong 12 tháng

Quý vị đã sẵn sàng bắt đầu hành trình đạt được mục tiêu xương chắc khỏe hơn chưa?

Được chấp thuận sử dụng

EVENITY® là thuốc kê đơn dùng để điều trị loãng xương ở phụ nữ sau mãn kinh có nguy cơ gãy xương cao hoặc không thể sử dụng thuốc trị loãng xương khác hoặc các loại thuốc trị loãng xương khác không có tác dụng tốt.

Thông tin Quan trọng về An toàn

Thông tin quan trọng nhất tôi nên biết về EVENITY là gì?

EVENITY có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng, bao gồm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ hoặc tử vong do vấn đề tim mạch (tim hoặc mạch máu). Gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị hoặc nhận trợ giúp khẩn cấp ngay lập tức nếu quý vị có bất kỳ triệu

chứng nào sau đây: triệu chứng đau tim, có thể bao gồm: đau ngực hoặc tức ngực; hụt hơi; cảm thấy choáng váng hoặc chóng mặt; hoặc các triệu chứng của đột quỵ, có thể bao gồm: nhức đầu; tê hoặc yếu ở mặt, cánh tay hoặc chân; khó nói chuyện; thay đổi thị lực hoặc mất thăng bằng. Trước khi dùng EVENITY, hãy cho bác sĩ biết nếu quý vị đã từng bị đau tim hoặc đột quỵ, đặc biệt là nếu tình trạng này xảy ra trong năm qua.

Vui lòng xem thêm Thông Tin An Toàn Quan Trọng ở trang 8.

Hiểu RỦI RO CỦA QUÝ VỊ

Không điều trị chứng loãng xương sau mãn kinh sẽ làm tăng thêm nguy cơ gãy xương.

- ▶ Sau khi mãn kinh, lượng xương cơ thể quý vị mất đi sẽ nhiều hơn lượng xương tạo ra
- ▶ Loãng xương là căn bệnh tiến triển âm thầm, có nghĩa là bệnh sẽ trở nên trầm trọng hơn theo thời gian nếu không được điều trị. Dấu hiệu cảnh báo duy nhất có thể là gãy xương
- ▶ 2 trong số 3 phụ nữ bị loãng xương sau mãn kinh có nguy cơ gãy xương cao sẽ bị gãy một xương nào đó trong đời
- ▶ Sau khi bị gãy xương do loãng xương, nguy cơ quý vị bị gãy xương lần nữa trong vòng một năm tăng cao gấp 5 lần

Biết rủi ro của quý vị

Quý vị càng có nhiều yếu tố nguy cơ sau đây thì nguy cơ gãy xương của quý vị càng cao.

- ☐ Điểm T nhỏ hơn hoặc bằng -2.5
- ☐ 65 tuổi trở lên
- ☐ Trọng lượng cơ thể thấp
- ☐ Đã từng gãy xương
- ☐ Sử dụng steroid lâu dài, chẳng hạn như prednisone
- ☐ Uống rượu bia ≥ 3 ly/ngày
- ☐ Cha mẹ bị gãy xương hông
- ☐ Hút thuốc lá
- ☐ Viêm khớp dạng thấp
- ☐ Bệnh tiểu đường

Thông tin Quan trọng về An toàn (tiếp)

Không dùng EVENITY® nếu quý vị: bị hạ canxi máu; hoặc bị dị ứng với romosozumab hoặc bất kỳ thành phần nào trong EVENITY.

Vui lòng xem thêm Thông Tin An Toàn Quan Trọng ở trang 8.

Quý vị lo lắng mình có thể gặp rủi ro?

Đừng chờ đến khi gãy xương. Hãy hành động ngay và trao đổi với bác sĩ về việc tái tạo xương mới bằng EVENITY.


BIẾT ĐIỂM CỦA QUÝ VỊ, biết quý vị có nhiều lựa chọn

Đã đến lúc cần chụp DXA chưa?

Chụp DXA là một thủ thuật nhanh chóng, không đau, không xâm lấn giúp đo mật độ xương và cung cấp điểm T để đánh giá mức độ loãng xương của quý vị và liệu quý vị có nguy cơ gãy xương hay không.

Nếu quý vị đã được chẩn đoán mắc bệnh loãng xương sau mãn kinh, bác sĩ có thể đề nghị kiểm tra mật độ xương 1 đến 2 năm một lần để theo dõi tiến trình điều trị của quý vị.

Điểm T của quý vị giúp xác định mức độ nghiêm trọng của nguy cơ gãy xương của quý vị




Thông tin Quan trọng về An toàn (tiếp)

EVENITY® có thể gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng. Các tác dụng phụ nghiêm trọng có thể xảy ra bao gồm phản ứng dị ứng nghiêm trọng, lượng canxi trong máu thấp, các vấn đề nghiêm trọng về xương hàm và gãy xương đùi bất thường.

Vui lòng xem thêm Thông Tin An Toàn Quan Trọng ở trang 8.


EVENITY nhanh chóng hình thành xương mới chỉ trong 12 tháng

XƯƠNG BỊ LOÃNG XƯƠNG



CHƯA ĐIỀU TRỊ

Mẫu xương chậu được lấy vào tháng thứ 12 từ một phụ nữ bị loãng xương sau mãn kinh đang dùng giả dược.



ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG EVENITY

Mẫu xương chậu được lấy vào tháng thứ 12 từ một phụ nữ bị loãng xương sau mãn kinh đang điều trị bằng EVENITY.

Chỉ nhằm mục đích minh họa. Mẫu xương được lấy từ 2 phụ nữ khác nhau trong một nghiên cứu nhỏ gồm 139 phụ nữ bị loãng xương sau mãn kinh. Hình ảnh được chọn là từ những phụ nữ gần mức trung bình trong mỗi nhóm.

Quý vị đã sẵn sàng làm nhiều hơn là chỉ làm chậm quá trình mất xương chưa?

Hãy hỏi bác sĩ xem bây giờ có phải là lúc để bắt đầu tái tạo xương mới hay không.



EVENTITY là phương pháp điều trị loãng xương đầu tiên và duy nhất có tác dụng theo hai cách

Các phương pháp điều trị loãng xương bằng thuốc kê đơn thường chỉ có tác dụng theo một trong hai cách: thuốc chống hủy xương làm chậm quá trình mất xương, trong khi thuốc đồng hóa giúp kích thích hình thành xương.

EVENTITY là chất tạo xương duy nhất có thể giúp làm chậm quá trình mất xương, ở mức độ thấp hơn.



Bắt đầu bằng EVENTITY

1=2

LIỀU TIÊM
LƯỢNG

Mỗi liều EVENTITY bao gồm 2 mũi tiêm



ĐƯỢC TIÊM HÀNG
THÁNG

EVENTITY được cung cấp hàng tháng trong chuyến thăm khám tại phòng khám của quý vị

12

THÁNG

EVENTITY chỉ được dùng trong 12 tháng

Mỗi liều EVENTITY bao gồm 2 mũi tiêm dưới da được bác sĩ hoặc nhân viên chăm sóc sức khỏe tiêm cho quý vị mỗi tháng. Quý vị nên bổ sung canxi và vitamin D theo chỉ định của bác sĩ trong thời gian dùng thuốc EVENTITY. Nếu quý vị bỏ lỡ một cuộc hẹn, hãy liên hệ với bác sĩ của quý vị càng sớm càng tốt để lên lịch lại.

Thông tin Quan trọng về An toàn (tiếp)

Tác dụng phụ phổ biến nhất của EVENTITY là đau khớp và nhức đầu.


Vui lòng xem thêm Thông Tin An Toàn Quan Trọng ở trang 8.

Quý vị đã sẵn sàng làm nhiều hơn việc chỉ làm chậm quá trình mất xương chưa?

Hãy hỏi bác sĩ xem bây giờ có phải là lúc để bắt đầu tái tạo xương mới hay không.

Kết quả tại 12 THÁNG

EVENTITY làm tăng đáng kể mật độ khoáng xương ở cột sống thắt lưng, toàn bộ hông và cổ xương đùi sau 12 tháng so với giả dược*



*Kết quả BMD không ngụ ý giảm nguy cơ gãy xương.

Trong một nghiên cứu theo dõi hơn 7.000 phụ nữ bị loãng xương sau mãn kinh được dùng EVENTITY hoặc giả dược (một phương pháp điều trị không dùng thuốc) trong 12 tháng, những phụ nữ dùng EVENTITY có mật độ khoáng xương (BMD) ở cột sống thắt lưng, toàn bộ hông và cổ xương đùi tăng đáng kể so với những phụ nữ dùng giả dược.

Thông tin Quan trọng về An toàn (tiếp)

Quý vị nên bổ sung canxi và vitamin D theo chỉ định của bác sĩ trong thời gian dùng thuốc EVENTITY.

Vui lòng xem thêm Thông Tin An Toàn Quan Trọng ở trang 8.

EVENTITY làm giảm đáng kể nguy cơ gãy xương cột sống chỉ trong 12 tháng

Trong cùng một nghiên cứu lâm sàng được trình bày trong bài viết này, những phụ nữ dùng EVENTITY ít bị gãy xương cột sống mới hơn những phụ nữ dùng giả dược sau 12 tháng. Tỷ lệ gãy xương ngoài cột sống giảm không đáng kể sau 12 tháng.

Sau 12 tháng sử dụng EVENTITY, hãy hỏi bác sĩ của quý vị về

- ▶ Lên lịch chụp DXA để xem kết quả điều trị của quý vị sau EVENTITY
- ▶ Một phương pháp điều trị tiếp theo để duy trì xương mới hình thành

Đã đến lúc bắt đầu tái tạo xương mới với EVENTITY chưa?

Hãy hỏi bác sĩ xem EVENTITY có phù hợp với quý vị không.




EVENTITY đã được nghiên cứu trên gần 12.000 phụ nữ

Bất cứ khi nào quý vị bắt đầu dùng một loại thuốc mới, quý vị nên hiểu rõ những tác dụng phụ có thể xảy ra. **Trong trường hợp loãng xương, điều quan trọng là phải hiểu rằng không điều trị có thể dẫn đến nguy cơ gãy xương cao hơn.** Nói chuyện với bác sĩ của quý vị và cùng nhau quý vị có thể đưa ra quyết định sáng suốt.

Một nghiên cứu của EVENTITY trên 7.000 phụ nữ

An toàn thuốc là điều quan trọng. EVENTITY đã được nghiên cứu để tìm hiểu về những lợi ích và tác dụng phụ có thể xảy ra khi sử dụng thuốc này.

Một nghiên cứu của EVENTITY đã đánh giá hơn 7.000 phụ nữ bị loãng xương sau mãn kinh được dùng EVENTITY hoặc giả dược. Tác dụng phụ thường gặp nhất là đau khớp và nhức đầu. Đây không phải là tất cả các tác dụng phụ có thể xảy ra của EVENTITY. Hãy trao đổi với bác sĩ để tìm hiểu thêm về các tác dụng phụ nghiêm trọng tiềm ẩn của EVENTITY. Xem phần so sánh các tác dụng phụ phổ biến nhất từ nghiên cứu được báo cáo dưới đây.



Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập
eventity.com Vui lòng

Thanh toán cho EVENTITY®



EVENTITY được bảo hiểm bởi nhiều chương trình Medicare và thương mại

Chi phí tự chi trả của từng bệnh nhân sẽ khác nhau.

MEDICARE

- ▶ Hầu hết bệnh nhân Medicare Phần B đều có bảo hiểm bổ sung và có thể trả 0 đô la cho mỗi liều EVENTITY*†
- ▶ Sau khi quý vị đạt đến hạn mức khấu trừ của mình, Medicare Phần B thường chi trả 80% các liệu pháp quý vị nhận được tại văn phòng bác sĩ của mình
- ▶ Quý vị có thể mua thêm bảo hiểm (ví dụ: Chương trình bổ sung Medicare hoặc Medigap, thương mại, TRICARE) để được hưởng thêm 20%‡
 - Quý vị có thể phải trả thêm phí bảo hiểm hàng tháng với các bảo hiểm bổ sung này
 - Chi phí tự chi trả không bao gồm chi phí liên quan đến việc khám tại phòng khám hoặc tiêm EVENTITY
- ▶ Số tiền quý vị phải trả cho EVENTITY sẽ tùy thuộc vào loại chương trình Medicare mà quý vị tham gia. Hãy trao đổi với công ty bảo hiểm của quý vị để tìm hiểu số tiền quý vị sẽ phải trả cho EVENTITY

*Dữ liệu xác minh bảo hiểm Amgen SupportPlus từ tháng 01 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023 đã được phân tích để xác định Phân phối OOP. EVENTITY chỉ đưa bệnh nhân tiêm năng vào phân tích.

†Số tiền quý vị phải trả có thể tùy thuộc vào phạm vi bảo hiểm bổ sung.

‡Quý vị phải đăng ký Medicare Phần A và Phần B để nhận được bảo hiểm thông qua Bảo hiểm Bổ sung Medicare (Medigap). Bảo hiểm Bổ sung Medicare có thể yêu cầu phí bảo hiểm bổ sung hàng tháng.

BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI

- ▶ Chương trình đồng thanh toán Amgen® SupportPlus có thể giúp bệnh nhân có bảo hiểm tư nhân hoặc thương mại giảm chi phí tự trả của họ Nếu
- ▶ Bệnh nhân đủ điều kiện được bảo hiểm thương mại có thể chỉ phải trả 25 đô la cho mỗi liều với Chương trình đồng thanh toán Amgen SupportPlus
- ▶ Có thể áp dụng cho khoản khấu trừ, đồng bảo hiểm và đồng thanh toán
- ▶ Tiêu chí đủ điều kiện và mức tối đa của chương trình được áp dụng. Xem www.amgensupportplus.com/copay để biết đầy đủ Điều khoản và Điều kiện



KHÔNG ĐƯỢC BẢO HIỂM

- ▶ Đại diện Amgen SupportPlus có thể cung cấp thông tin về các tổ chức phi lợi nhuận độc lập có thể giúp đỡ. Vui lòng liên hệ với Amgen SupportPlus để biết thêm thông tin theo số 1-866-264-2778

[§]Việc đủ điều kiện nhận các nguồn lực do các chương trình hỗ trợ bệnh nhân phi lợi nhuận độc lập cung cấp là tùy thuộc vào tiêu chí của tổ chức phi lợi nhuận đó. Amgen không kiểm soát các chương trình này và chỉ cung cấp thông tin như một phép lịch sự.



Nếu quý vị không chắc chắn mình có chương trình Medicare nào hoặc đang tìm kiếm thêm thông tin, hãy nói chuyện với nhà cung cấp bảo hiểm của quý vị và truy cập evenity.com/paying để biết thêm chi tiết.

Thông tin Quan trọng về An toàn

Thông tin quan trọng nhất tôi nên biết về EVENITY® là gì?

EVENITY có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng, bao gồm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ hoặc tử vong do vấn đề tim mạch (tim hoặc mạch máu). Gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị hoặc nhận trợ giúp khẩn cấp ngay lập tức nếu quý vị có bất kỳ triệu chứng nào sau đây: triệu chứng **đau tim**, có thể bao gồm: đau ngực hoặc tức ngực; hụt hơi; cảm thấy choáng váng hoặc chóng mặt; hoặc các triệu chứng của **đột quỵ**, có thể bao gồm: nhức đầu; tê hoặc yếu ở mặt, cánh tay hoặc chân; khó nói chuyện; thay đổi thị lực hoặc mất thăng bằng. Trước khi dùng EVENITY, hãy cho bác sĩ biết nếu quý vị đã từng bị đau tim hoặc đột quỵ, đặc biệt là nếu tình trạng này xảy ra trong năm qua.

Không dùng EVENITY nếu quý vị: bị hạ canxi máu; hoặc bị dị ứng với romosozumab hoặc bất kỳ thành phần nào trong EVENITY.

Trước khi dùng EVENITY, hãy cho bác sĩ biết về mọi tình trạng bệnh lý của quý vị, bao gồm cả trường hợp hợp quý vị:

- có tiền sử các vấn đề về tim hoặc mạch máu khác
- có lượng canxi trong máu thấp
- không thể uống canxi và vitamin D hàng ngày
- có vấn đề về thận hoặc đang chạy thận
- dự định phẫu thuật nha khoa hoặc nhổ bỏ răng

Tác dụng phụ có thể xảy ra của EVENITY là gì?

EVENITY có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng, bao gồm:

Phản ứng dị ứng nghiêm trọng đã xảy ra ở những người dùng EVENITY. Gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị hoặc đến phòng cấp cứu gần nhất ngay nếu quý vị có bất kỳ triệu chứng nào của phản ứng dị ứng nghiêm trọng bao gồm: phát ban; nổi mề đay; sưng mặt, môi, miệng, lưỡi hoặc cổ họng có thể gây khó nuốt hoặc thở.

Nồng độ canxi trong máu thấp (hạ canxi máu). EVENITY có thể làm giảm nồng độ canxi trong máu của quý vị. Tình trạng canxi trong máu thấp của quý vị cần được điều trị trước khi dùng EVENITY. Gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu quý vị có các triệu chứng của lượng canxi trong máu thấp như: co thắt, co giật hoặc chuột rút ở cơ; tê hoặc ngứa ran ở ngón tay, ngón chân hoặc quanh miệng.

Các vấn đề nghiêm trọng về xương hàm (hại tử xương) có thể xảy ra. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ kiểm tra miệng của quý vị trước khi quý vị bắt đầu sử dụng EVENITY và có thể yêu cầu quý vị đến gặp nha sĩ. Hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc nha sĩ của quý vị về cách chăm sóc răng miệng tốt.

Gãy xương đùi bất thường. Các triệu chứng của loại gãy xương này bao gồm cơn đau mới hoặc bất thường ở hông, háng hoặc đùi.

Tác dụng phụ phổ biến nhất của EVENITY bao gồm đau khớp và nhức đầu.

Đây không phải là tất cả các tác dụng phụ có thể xảy ra của EVENITY. Gọi cho bác sĩ để được tư vấn y tế về tác dụng phụ.

Quý vị được khuyến khích báo cáo cho FDA các tác dụng phụ tiêu cực của thuốc theo toa. Truy cập www.fda.gov/medwatch hoặc gọi 1-800-FDA-1088.

Vui lòng xem Thông tin kê đơn đầy đủ của EVENITY đi kèm, bao gồm cả Hướng dẫn dùng thuốc.

Một số cách giúp quý vị bắt đầu thảo luận với bác sĩ:

- Điều gì có thể xảy ra nếu tôi không điều trị chứng loãng xương sau mãn kinh?
- Chất tạo xương như EVENITY® có thể giúp giảm nguy cơ gãy xương của tôi như thế nào?
- EVENITY so với các phương pháp điều trị loãng xương sau mãn kinh khác như thế nào?

Quý vị cũng có thể truy cập evenity.com.



Nhận hỗ trợ với chương trình Bone Matters®.

Bệnh nhân EVENITY có thể đăng ký để nhận lời nhắc tiêm miễn phí, thông tin dinh dưỡng và mẹo để duy trì cuộc sống năng động tại bonematters.com

AFFIDAVIT OF ACCURACY

Project number: O-519562

Delivered on: 11/28/24

File Name(s) Received:

EVENTITY Patient Brochure - Unleashed Redesign.pdf

File Name(s) Delivered:

EVENTITY Patient Brochure - Unleashed Redesign_ZH-TW.docx

EVENTITY Patient Brochure - Unleashed Redesign_KO.docx

EVENTITY Patient Brochure - Unleashed Redesign_ES-US.docx

EVENTITY Patient Brochure - Unleashed Redesign_VI.docx

CQ fluency hereby certifies that the translation of the above-referenced document(s) has been completed by highly qualified linguists following the applicable processes and workflows of our Quality Management system, in conformance with the requirements set forth by ISO 9001:2015 and ISO 17100:2015.

As such, we hereby certify that nothing has been omitted or added, and that to the best of our knowledge and ability the Spanish (US), Korean, Vietnamese, Chinese (Traditional) deliverable is an accurate representation of the English version.

Signature: Mariana Pezzi
Mariana Pezzi (Nov 28, 2024 09:34 EST)

Printed Name: Pezzi, Mariana

Title: Associate Project Manager

Date: 11/28/24

Reason for
signing: I have reviewed and approve of the information above.